



Zilnic, aproximativ 20 de maramureșeni ajung la spital cu înțepături de căpușe. Medicii au depistat deja și trei persoane infectate cu Borrelia, responsabilă pentru boala Lyme. Medicii specialiști susțin că numărul celor înțepați a crescut în această lună, comparativ cu luna mai. „Avem aproximativ 15-20 de persoane pe zi, care vin cu înțepături de căpușe și mai ales în zilele de sâmbătă, duminică și luni. Toată lumea iese la iarbă verde și atunci vin cu câte o căpușă, două, trei, depinde de persoană. Sunt și copii mici, și adulți, și tineri, și vârstnici. Am avut într-o zi și un copilăș de trei săptămâni, iar mama a spus că nici măcar nu l-a scos din landou, dar s-a plimbat prin parc și probabil că a căzut o căpușă”, a declarat dr. Zenovia Pop, medicul-șef al Secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare.

Trei maramureșeni mușcați, infectați cu Borrelia

Maramureșenii înțepați trebuie să urmărească zona respectivă timp de două săptămâni, pentru a depista din timp o eventuală infecție cu boala Lyme. „Populația trebuie să știe că doar 20% din căpușe sunt purtătoare de Borrelia. Restul de 80% nu sunt infectate. După ce le scoatem căpușa, le recomandăm celor care au fost înțepați să urmărească locul două săptămâni. Dacă în acest interval apare un inel roșu care se extinde în jurul înțepăturii, atunci înseamnă că persoana respectivă a fost infectată cu Borrelia și aceasta este prima fază a bolii Lyme și se numește eritem migrator. Atunci facem analize să vedem dacă este vorba de o infecție sau nu. Dacă este, atunci pacientul primește tratament cu antibiotice timp de 10-14 zile. Boala este tratabilă, dacă este depistată. Din numărul mare de pacienți, am avut două-trei cazuri de eritem migrator”, a concluzionat Zenovia Pop.

Înțepăturile de căpușe s-au înmulțit - Sfaturi pentru evitarea infectării cu Borrelia

Numărul maramureșenilor care vin la spital cu înțepături de căpușe a crescut în ultimii ani. Medicii susțin că tot mai multă lume apelează la medic pentru a-și scoate căpușele și recomandă persoanelor înțepate să nu încerce să le îndepărteze pe cont propriu.

„Sunt multe cazuri și de câțiva ani încoace numărul înțepăturilor a crescut foarte mult. Înainte nu veneau așa de mulți, dar se poate ca înainte să nu fi venit lumea. Și le scotea singură și nu venea la spital. Acum pacienții se adresează medicului și bine fac. Este mai bine să vină la medic să le scoatem noi, scoatem și capul de căpușă, ușor, cu acul. Lumea nu trebuie să se

sperie dacă, local, apare o iritație imediat după înțepătură. Asta nu este boală. În astfel de cazuri se prescrie un unguent pentru zona respectivă, ca la orice înțepătură de insectă. Așa trece și senzația de mâncărime și roșeața, dar locul trebuie urmărit două săptămâni. Dacă nu apare nimic, atunci înseamnă că respectiva căpușă nu a fost infectată cu *Borrelia*”, a declarat dr. Zenovia Pop, medicul-șef al Secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare.

Măsuri de protecție acasă și la iarbă verde

Pentru a se proteja de înțepăturile de căpușe, medicii recomandă îmbrăcăminte cu mânecă lungă, pe cât posibil, și evitarea locurilor cu iarbă înaltă. Cei care ies la iarbă verde trebuie să-și facă o inspecție a întregului corp, când ajung acasă, pentru a depista imediat eventualele înțepături.

„Mijloace de protecție sunt îmbrăcăminte de culoare albă, cu pantaloni lungi și tricou cu mânecă lungă. La fel, există diverse insecticide care se găsesc în farmacii. Când lumea merge la iarbă verde, nu trebuie să se așeze în locurile cu iarbă înaltă, la liziera pădurii, unde trăiesc căpușele. În jurul casei, oamenii trebuie să-și taie iarba. Cei care ies la iarbă verde, mai ales la copii, dar și la adulți, bine ar fi să-și facă o inspecție a corpului, la întoarcerea acasă”, a explicat dr. Zenovia Pop.

sursa:

www.infomm.ro