



Testarea nivelului de cafeina din sange poate fi o modalitate mai simpla de diagnosticare a bolii Parkinson, potrivit unui studiu publicat luna aceasta in revista medicala "The American Academy of Neurology", conform aan.com. Cercetatorii japonezi au constatat ca persoanele care sufera de Parkinson au un nivel semnificativ scazut de cafeina in sange, prin comparatie cu persoanele sanatoase, chiar daca cele dintai consumau aceeasi cantitate de cafeina cu cei din urma.

"Studiile efectuate anterior pe aceasta tema au aratat ca exista o legatura intre nivelul de cafeina din sange si riscul dezvoltarii bolii Parkinson, insa pana in prezent nu s-au stiut prea multe detalii despre modul in care cafeina este metabolizata de organismul persoanelor care au Parkinson," a declarat autorul principal al studiului, Shinki Saiki, cercetator in cadrul Facultatii de Medicina de la Universitatea Juntendo din Tokyo.

"Analizele medicale efectuate in randul voluntarilor la studiu au aratat ca persoanele care se aflau in stadii avansate ale bolii au avut un nivel scazut de cafeina in sange, iar datele studiului arata ca aceasta scadere se inregistreaza in primele stadii ale bolii," potrivit lui David G. Munoz, cercetator in cadrul Universitatii din Toronto.

Daca rezultatele studiului vor fi confirmate, pacientii vor putea beneficia de o metoda simpla de diagnosticare precoce a bolii Parkinson, chiar inainte ca primele simptome sa se manifeste. Aceasta este un aspect deosebit de important, avand in vedere ca boala Parkinson este dificil de diagnosticat, in special in stadiile sale incipiente.

Articol integral pe
Medlife.ro