



Se stie ca un copil nascut de o mama supraponderala prezinta un risc crescut de obezitate, cu tulburarile proprii excesului de greutate. Cercetatori englezi demonstreaza ca fenomenul incepe chiar din viata intrauterina, relateaza passionsante.be. Echipa de la Chelsea and Westminster Hospital (Londra) a recurs la imagistica medicala. Intr-un articol publicat de revista 'Pediatric Research', specialistii arata ca au 'scanat' circa o suta de nou-nascuti in timp ce dormeau, pentru a determina cantitatea de grasime din ficat, cantitatea totala de grasime din organism, precum si felul in care este repartizata.

Rezultatul a fost ca nivelurile erau crescute in functie de indicele de masa corporala (IMC) al mamei, calculat la inceputul sarcinii. Procesul a fost observat doar la mamele obeze, inasa de indata ce IMC depasea pragul considerat 'satisfacator' (24-25). Pr Neena Modi, neonatolog si coordonator al studiului, este de parere ca trebuie sa se acorde o atentie deosebita bebelusilor nascuti de mame supraponderale, in vederea adoptarii cat de timpuriu posibil a unei strategii anti-obeziitate specifice.

In plus, ar fi necesara determinarea IMC-ului ideal inaintea sarcinii, pentru ca viitoarele mame sa fie cat mai corect informate.

sursa: emaramures.ro